

NILOCIN®VORTEPEN

Vejledning

Det anbefales at blødgøre vorten i lunket vand i minimum 5 minutter inden behandlingen. Såfremt vorten er dækket af hård hud, kan vorten forsigtigt skrubes på overfladen. Den hårde hud fjernes forsigtigt. Fil ikke på vorten. Børn bør behandles af en voksen.

1. Fjern hættten fra Nilocin Vorte Pen.
2. Vorten masseres forsigtigt med tippen af pennen i 20 sekunder. Behandlingen trænger straks ned i vorten. Hele overfalden af vorten skal behandles. Undgå kontakt med den sunde omgivende hud. Hættten påsættes omhyggeligt efter brug.
3. Behandl 3 gange ugentligt i op til 6 uger. Der behandles hver anden dag. Hold herefter 2 dages pause – hvorefter denne behandlingscyklus kan genoptages indtil vorten er væk.

Det anbefalede antal applikationer må ikke overskrides.

Nilocin Vorte Pen leverer en lille mængde farveløs ætsende væske. Er du i tvivl om pennen er tør, presses tippen let mod absorberende papir, og der fremkommer et vådt mærke.

Opstår der ubehag eller smerte stoppes appliceringen. Opstår der en sviden eller brændende fornemmelse eller er behandlingen ved et uheld appliceret på den sunde omgivende hud, skylles med koldt vand.

Opbevares i den originale emballage, ved 2-25°C, udenfor direkte sollys, og udenfor børns synsfelt og rækkevidde. Må ikke benyttes efter udløbsdatoen eller 6 måneder efter første brug. Hættten påsættes omhyggeligt efter brug. Afskaffes i affaldsbøtte til farligt affald.

Forholdregler

Kun til udvortes brug. Skal opbevares ude af syne og utilgængeligt for børn. Produktet indeholder et ætsende middel, med en stærk lugt. Inhaler ikke.

- Benyt ikke Nilocin til behandling af kønsvorter samt i ansigtsregionen.
- Undlad at bruge Nilocin, hvis du er overfølsom overfor indholdsstofferne, samt hvis du er overfølsom overfor bistik og myrebid.
- Undgå kontakt med sund hud rundt om vorten.
- Udsæt ikke det behandlede område for sollys, så længe behandlingen pågår.
- Anvend ikke på ømme eller blødende vorter, blærer samt irriteret, betændt eller beskadiget hud. Hold pause med behandlingen indtil huden er restitueret.
- Anvend ikke på vorter med hår, modermærker, pigmenteret hud, eller i tilfælde af at du er i tvivl om hudens tilstand er en vorte.
- Ekstra forsigtighed bør udvises, når behandlingen påføres tynd og følsom hud, og når børn og diabetikere behandles.

- Det er bedre at påføre for lidt væske end for meget, for at undgå sår, blister, inflammationer, vævsdød, ar og kemiske forbrændinger.
- Overskrid ikke antallet af anbefalede applikationer.
- Konsulter læge, såfremt det behandlede område bliver rødt og smertefuldt eller betændt.
- Enkelt patient – flergangsbrug.
- Benyt ikke Nilocin i kombination med andre vorte behandlings produkter.
- Benyt ikke til børn under 4 år, med mindre ordineret af læge.

HVIS PRODUKTET VED ET UHELD KOMMER I ØJNENE, SKYL STRAKS ØJNENE MED RIGELIGE MÆNGDER LUNKENT VAND OG GENTAG I 15 MINUTTER. KONTAKT LÆGE ELLER SKADESTUE.

Bivirkninger

Det er vigtigt at produktet anvendes som foreskrevet. Antallet af applikationer må ikke overskrides, idet dette kan medføre hudskader (se også indlægssedlen).

En mild snurren eller brændende fornemmelse kan i visse tilfælde fornemmes i 10-15 minutter efter applicering. Ved overeksponering kan midlertidige bivirkninger opstå. f.eks. en stikkende fornemmelse, rødme, smerte eller blødning. Stop med brug indtil huden er fuldt restitueret.

Der er ingen kendte bivirkninger for gravide og ammende.

Alvorlige hændelser bør indberettes til Unigroup eller relevant myndighed.

Teknisk data

Inkluderer: 3 ml. Pen, samt indlægsseddel.

Ingredienser (INCI): Formic acid, (85%) Dimethyl isosorbide, Aqua, Caprylic acid, Origanum vulgare leaf extract.

Varenr.: 101034

Registrering: Medicinsk udstyr, klasse IIa

Nilocin Vorte Pen er klassificeret som medicinsk udstyr og er underlagt kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med ISO 13:485.