



Hopeanitraattitikuilla on kaustinen ja bakteereja tappava vaikutus. Kun tikkuihin lisätään kosteutta, seurauksena on proteiinien denaturoituminen ja sitten käsitellyn kudoksen kuivuminen. Hopeanitraatin lisäksi tikuissa on kaliumnitraattia, joka helpottaa hoitoa tietyillä alueilla.

Hoito

Kostuta tikku aina varoen läikyttämistä, koska värin poistaminen on vaikeaa. Iho muuttuu mustaksi 24 tunnin sisällä.

Granulaatiokudos

Koska lapis kirvelee avoimella iholla tai haavalla, sitä tulee aina käyttää vain muulle kuin avoimelle iholle. Granulaatiokudoksen kohdalla, käytä lapista tarvittaessa vain turvonneen kudoksen “yläosassa”, kunnes granulaatiokudosta on vähemmän.

Puhdista niin laajalti kuin mahdollista ennen hoitoa.

Ennen kuin käsittelet granulaatiokudosta, voit tarvittaessa aloittaa jalkahoidon laapistamalla – ja lopuksi poistamalla se, mikä voidaan poistaa (koska kudos on supistunut hieman ja siten sen poistaminen on helpompaa) - granulaatiokudoksen hoito voidaan toteuttaa parin päivän välein ja siten suuremmalla alueella, mutta tämä riippuu yksittäisen hoitajan harkinnasta. Granulaatiokudosta ei voida aina poistaa, mutta se voidaan pitää kurissa tällä käsittelyllä.

Syyvät

Desinfioi alue ja leikkaa. Jos syytä on suuri, voit tarvittaessa aloittaa laapistamalla jalkahoidon alussa, jotta suonet supistuvat ennen kuin leikkaat.

Kosteuta tikku ja taputtele lapiksella. Laita laastari.

Hoito uusitaan n. 7-10 päivän välein.

Jos 10 hoitoa ei vaikuta, pidetään tauko - ja usein käy niin, että prosessi on käynnistynyt ja syytä katoaa.

Jos syyliä on useita, aloitetaan “isoista” syylistä, joiden jälkeen pienet usein seuraavat perässä.

Verisuonittuneet känsät (neurovaskulaariset)

Laapista känsä hoidon aluksi, jotta verisuonet vetäytyvät ennen kuin hoidon lopuksi työskentelet skalpellilla.

Hermokipu painealueilla

Alueita, joilla on painorasitusta ja näkyviä hermoja, voidaan hoitaa lapiksella, sillä se saa hermot vetäytymään.